



丸種新品種のご紹介

宇治交配 西瓜 黒皮赤肉ミディ  
**マイボーイ**  
 (MWX - 851)

輸送性、日持ち性抜群、シャリ感あふれる黒皮赤肉ミディ



特性

1. 草勢は中位、葉はやや立ち葉で硬く、蔓の伸長は低温期でも良好です。雌花の着生も安定し、花粉の発生も強く着果が容易で、安定した収穫が望めます。
2. 外皮は黒紫色で玉揃いよく球重3.0~3.5kgのミディスイカです。
3. 果肉は朱鮮紅色でやしまり気味の肉質はシャリ感に富み、糖度12度以上に安定し食味良好です。
4. 外皮は薄く5mm前後ですが、硬さは十分あり、輸送中の裂果や生育中の生理的な裂果も殆どありません。
5. ハウス・大型トンネルから露地栽培の8月収穫まで幅広い作型に適します。

栽培のポイント

1. 土質はあまり選びませんが、通気性のよい排水の良好な圃場が適します。施肥は前作物や土質・作型にもよりますが、標準的な施肥総量は10a当たりN10~15kg、P20~23kg、K18~20kg程度とし、大玉西瓜より20~30%減量を基準とします。ただし、りん酸はやや多めに施します。
2. 追肥は果実の肥大期に草勢を見ながら行います。2番果以降の収穫を行う場合は、草勢に強弱ができないよう、有機質肥料や液肥等で追肥を行い、2番果収穫期まで草勢を維持します。
3. 定植苗は極端な若苗は避け大鉢育苗を行い、大苗定植(50~55日苗)をします。また、親づるの摘芯はあらかじめ苗床で行い、草勢の回復後定植します。
4. 蔓仕立ては4~5本整枝3~4果どりを基本とします。着果節位は3番花(18~20節)を目安に、なるべく同日に咲いたものを着果させます。
5. 熟期は6~7月収穫で開花後33~35日を目安にします。熟期は着果位置や草勢の強弱によって異なるので、必ず試し切りを行って適熟で収穫して下さい。

下記標準栽培表参考に貴地の気候に合わせて栽培して下さい。

	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ハウス促成	-----	x	*			□						
ハウス半促成		-----	x	*		□						
ハウス半促成			-----	x	*	□						
大型トンネル				-----	x	*	□					
中型トンネル					-----	x	*	□				
露地キャップ						-----	x	*	□			
抑制	*	*	□	□						-----	x	x

播種 ----- 育苗・接木 x 定植 \* 交配 — 生育 □ 収穫

丸種株式会社

元気な種、すくすくと。  
 〒600-8691 京都市下京区七条新町西入ル  
 TEL:075-371-5101 FAX:075-371-5108  
 E-mail:tane@marutane.com  
 URL:http://www.marutane.com