

宇治交配

すいか
WATER MELON



高糖度、シャリ感あふれる紅こだま

姫甘泉

ひめかんせん

シャリツと
みっ
実甘
かか
大玉感満



姫甘泉 (ひめかんせん)

WATER MELON

高糖度、シャリ感あふれる紅こだま

- 低温着果性にすぐれ、栽培容易です。
- 濃緑地にやや太い縞を現し美しい外観です。
- 高糖度でシャリ感強く、食味最高です。
- 外皮がたく、輸送性にすぐれています。
- 日持ち性抜群で、高温期でも果実内容が安定しています。

◆特性と栽培のポイント◆

■特性

- 草勢は中位で、葉はやや立ち葉で硬く、蔓の伸長は低温期でも良好です。雌花の着生も安定し、花粉の発生も強く着果が容易で、安定した収穫が望めます。
- 果実はやや腰高で肩張り良く、果重2~2.5kgで濃緑地に鮮明でこだまとしてはやや太めの縞を現し玉揃抜群です。
- 果肉は鮮濃紅色で色ムラ少なく、大玉品種の「甘泉」程度の締まりがあり、シャリ感強く高糖度(brix13以上)で、食味最高です。2番果以降の品質低下も少なく、7月~8月の高温期収穫でも果肉の変質や軟化が殆どありません。
- 外皮は薄く3mm前後ですが、硬さは十分あり、輸送中の裂果や生育中の生理的な裂果も殆どありません。
- ハウス・大型トンネル栽培が主体ですが、露地栽培の8月収穫や抑制栽培での10~12月収穫にも適します。

■栽培のポイント

- 土質はあまり選ばませんが、通気性のよい排水の良い圃場が適します。施肥は前作物や土質・作型にもよりますが、大玉西瓜より20~30%減量を基準とします。ただし、りん酸はやや多めに施します。
- 追肥は果実の肥大期に草勢を見ながら行います。2番果以降の収穫を行う場合は、草勢に強弱ができないよう、有機質肥料や液肥等で追肥を行い、2番果収穫期まで草勢を維持します。
- 定植苗は極端な若苗は避け大鉢育苗を行い、大苗定植(50~55日苗)をします。また、親づるの摘芯はあらかじめ苗床で行い、草勢の回復を待って、定植します。
- 蔓仕立ては3本整枝2果どり、4本整枝3果どり、7~8本整枝6果どりを基本とします。着果節位は3番花(18~20節)を目安に、なるべく同日に咲いたものを着果させます。多づる栽培では、元成果を早めに摘果して、18~20節前後の3番花が一斉に開花したものに着果させるように努めます。
- 熟期は3月収穫で開化後50日、4~5月収穫で40~45日、6~7月収穫では30~35日を目安にして下さい。熟期は、着果位置や草勢の強弱によって異なるので、必ず試し切りを行って適熟で収穫して下さい。外皮が硬く、打音での内容検査は判定が困難なので注意して下さい。
- ハウス促成の3月収穫の栽培は多重被覆となり、光量が少なくなりやすい作型ですので、出来るだけ新しいビニールを使用し、早い時期からマルチ張りを行い地温の確保にも努めて下さい。

	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ハウス促成	●	-----	×	*	-----	■						
ハウス促成I		●	-----	×	*	-----	■					
ハウス促成II			●	-----	×	*	-----	■				
大型トンネル				●	-----	×	*	-----	■			
中型トンネル					●	-----	×	*	-----	■		
露地キャップ						●	-----	×	*	-----	■	
抑制	*	*	-----	■						●	-----	×

● 播種 ----- 育苗 × 定植 ——— 生育 * 交配 ■ 収穫

丸種株式会社 元気な種、すくすくと。

本社 / 〒600-8691 京都市下京区七条通り新町西入ル TEL 075-371-5101(代) FAX 075-371-5108
 研究農場 / 〒520-3242 滋賀県甲賀郡甲西町苔提寺 TEL 0748-74-1606 FAX 0748-74-0261