



MARUTANE
Quality Seeds

Seedless Watermelon シードレススイカ

ブラックジュニア

宇治交配

ほお晴れBJ (MWX-701)

ほお晴れの黒皮タイプ、手頃な中玉サイズで食味最高！

特 性

- ① 三倍体(シードレススイカ)のなかでもシイナが特に小さく、非常に食べやすいスイカ。
- ② 縞がほとんど透けない黒緑色の果皮で差別化しやすいユニークな外観です。果形は正球形で、3～4kgの中玉スイカ。
- ③ シャリ感に富み、肉質のよくシマった大変おいしいスイカです。糖度は12度以上で安定します。
- ④ 三倍体スイカとしては草勢が大人しいため、着果が良く形状が乱れにくい。また、多づるで栽培した場合でも、大小なくよく揃います。

※ 本種は三倍体利用のシードレス品種のため、まれに異数体(交配しても着果・肥大しない株)が見られることがあります。



栽培のポイント!

- ① 低温期には変形果が発生しやすくなるので、6月下旬以降に収穫する作型に適します。
- ② 草勢が強いため、普通大玉スイカより3割程度減肥して下さい。
- ③ 整枝栽培の場合は、子づる5～6本仕立て4果収穫、露地栽培では、株間90cmで株当り5～6果収穫を基本とし、3番花(18～20節)を目標に着果させます。
- ④ 発芽適温は普通スイカよりも2℃程度高い30～32℃です。
- ⑤ 三倍体スイカ自身の花粉では着果しないため、着果には普通スイカの花粉が必要です。ハウス、トンネルでは、人工交配が基本。雨除けのない露地栽培の場合、普通スイカを1～2畝ごとに栽培すればミツバチ交配が可能です。
- ⑥ 果実肥大期以降に強い側枝を放置すると形状が乱れるので、適宜摘み取ってください。
- ⑦ 熟期は6月下旬収穫で交配後45～47日、7月収穫で42～44日が目安ですが、気候や栽培条件によって前後しますので、収穫期は必ず試し切りによって判定してください。

上記標準栽培表を参考に貴地の気候に合わせて栽培してください。

| | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハウス | | ● | ○ | × | — | — | — | — | — | — |
| トンネル | | ● | ○ | × | — | — | — | — | — | — |
| 露地 | | | ● | ○ | × | — | — | — | — | — |

● 播種 ○ 播種適期 ----- 育苗 × 定植 — 生育 □ 収穫

